

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

Kodevejledning for urogynækologiske diagnoser & procedurer

DIAGNOSER

Definitioner; se International Continence Society <https://www.ics.org/>

| Urininkontinens diagnoser | | |
|----------------------------------|---|---|
| DR329 | Urininkontinens UNS | Bruges kun som henvisningsdiagnose |
| DN393 | Stress urininkontinens | Bruges når mest dominerende type |
| DZ928E | Anamnese med operation for stress urininkontinens | Tillægskode ved recidiv stress UI efter tidligere operation for stress UI |
| DN394 | Anden form for urininkontinens | Bruges når hverken stress- eller urgency urininkontinens er dominerende |
| DN394C | Urgency urininkontinens | Bruges når mest dominerende type |

| Andre nedre urinvejs diagnoser | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| DR359B | Pollakisuri | |
| DN308C | Cystitis recidivans | |
| DR339 | Urinretention | |
| DR329C | Blæreatoni, ikke-neurogen | |

| Prolaps diagnoser | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DN811 | Cystocele | Bruges når median defekt dominerer |
| DN812 | Livmoderprolaps uden vaginalprolaps | |
| DN813 | Inkomplet uterovaginal prolaps | |
| DN813A | Prolaps af livmoderhalsen | |
| DN814 | Komplet uterovaginal prolaps | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|---------|--|---|
| DN815 | Uterovaginal prolaps UNS | Bruges kun som henvisningsdiagnose |
| DN816 | Vaginalt enterocele | |
| DN817 | Rektocele | |
| DN818D | Lateraldefekt i vagina | Bruges når lateral defekt dominerer |
| DN81.9 | Kvindelig genitalprolaps UNS | Bruges kun som henvisningsdiagnose |
| DN884 | Hypertrofisk forlængelse af livmoderhalsen | Diagnosekode implicit relateret til procedurekode "Resektion af livmoderhals" KLDC10 |
| DN99.3 | Vaginal prolaps efter hysterektomi | |
| DZ928F1 | Anamnese med operation for uterovaginal prolaps <i>i samme</i> kompartment | Tillægskode ved recidiv prolaps efter tidligere operation for prolaps. Recidiv defineres som recidiv i samme kompartment. |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Fistler i kønsorganer, diagnoser | | |
| DN820 | Vesikovaginal fistel | |
| DN821B | Ureterovaginal fistel | |
| DN821C | Uretrovaginal fistel | |
| DN821D | Uteroureterisk fistel | |
| DN823A | Rektovaginal fistel | |
| DN824B | Rektouterin fistel | |
| DK60.3 | Anal fistel | |

| |
|--------------------------|
| Vaginal diagnoser |
|--------------------------|

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|
| DN898J | Vaginalcyste | |
| DN895B | Vaginal atresi | |
| DN898H | Sår i vagina forårsaget af pessar | |
| DN895D | Vaginal striktur | |
| DN361 | Uretradivertikel | |
| DN362 | Caruncula urethrae | Bruges kun hvis eneste fund |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Skader på bækkenbund | | |
| DN818C | Ruptura perinei vetus | Bruges til alle perineale/ vaginale sequelae efter fødsel |
| DN818A | Relaxatio perinei | Eksklusionsdiagnose – f.eks. hos patienter obs pudendus neuropati |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Smerte tilstande | | |
| DN941 | Dyspareunia | |
| DT818J1 | Postoperative kroniske smerter efter gynækologisk operation | |
| DR522E | Komplekse langvarige eller kroniske ikke-maligne smerter | |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kolorektale diagnoser | | |
| DK59.0 | Forstoppelse | |
| DR15.9 | Afføringsinkontinens | |
| DK59.9 | Forstyrrelse i tarmfunktionen UNS | |
| DK62.2 | Analprolaps | Bruges ved prolaps af slimhinde |
| DK62.3 | Rektalprolaps | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|---------|--------------------------------|--------------------------|
| DK62.9 | Sygdom i anus eller rectum UNS | Bruges ved anale smerter |
| DK58.0 | Irritabel tyktarm med diarré | |
| DK50.9 | Crohns sygdom UNS | |
| DK51.9 | Ulcerøs colitis UNS | |
| DI 845A | Eksterne hæmoroider UNS | |
| DK60.2 | Analfissur UNS | |

| | |
|-----------------------|---|
| Second opinion | |
| BWTS1 | Læge-rekommanderet second opinion |
| BWTS7 | Second opinion, ikke læge-rekommanderet |

PROCEDUREKODER

| | | |
|--|--|--|
| Urininkontinens operationskoder | | |
| KLEG10 | Vaginal uretrocytostopeksi med slynge | Retropubisk slynge med syntetisk mesh |
| KLEG10A | Vaginal uretrocytostopeksi med slynge gennem foramen obturatum | Transobturator slynge med syntetisk mesh |
| KKDG30 | Abdominal slyngeoperation + fascietransplantat autograft (McGuire) | |
| KKDG00 | Retropubisk suspension af urinrør | Kolposuspension a. m. Burch |
| KKDV22 | Uretroskopiisk submukøs injektionsbehandling i urinrør | |
| KUKC02 | Cystoskopi | |
| KUKD02 | Urethroskopi | |
| KKCV05 | Transluminal injektion i blærevæg | Botox ved urgency urininkontinens |
| BJFA2 | Injektion af stamceller i urinrør | Eksperimentel anvendelse af stamceller |

| | Omfatter | Vejledning |
|--|----------|------------|
|--|----------|------------|

| Vaginal prolaps operationskoder | | |
|--|---|--|
| KLEF00 | Forreste kolporafi | |
| KLEF03 | Bageste kolporafi | |
| KLEF40 | Vaginal operation for enterocele | |
| KLDC10 | Resektion af livmoderhals | Sammen med KLEF00 "Manchester-koden" er udgået |
| KLEF60 | Vaginal lateral kolpopeksi | |
| KLCG20 | Hysteropeksi | Vaginal suspension af uterus til sacrospinøse ligament SSLH: Hysteropeksi til det sakrospinøse ligament |
| KLEF20 | Kolpogleise | Anvendes hos kvinder med uterus |
| KLED00 | Kolpektomi | Anvendes ved kvinder uden uterus |
| KLCD10 | Vaginal hysterektomi | |
| KLEF53 | Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi | Høj suspension fx. Bob Shull operation HUSLS : (Høj Utero Sakral Ligament Suspension) |
| KLEF53B | Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament | SSLF: Sakrospinøs ligament fiksatation |
| KZLA 01-02 tillægskoder for suspensionsteknikker ved hysterektomi | | |
| KZLA01 | Suspension af vaginaltop a.m. McCall | Lav suspension McCall suspension MUSLS: Midline USLS |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|--------|---|--|
| KZLA02 | Suspension af vaginaltop a.m. Bob Shull | Høj suspension fx. Bob Shull operation HUSLS : (Høj Utero Sakral Ligament Suspension) |
|--------|---|--|

Vaginal prolaps operation med implantat

| | |
|---------|---|
| KLEF00A | Forreste kolporafi med mesh |
| KLEF03A | Bageste kolporafi med mesh |
| KLEF40A | Vaginal operation for enterocele med mesh |
| KLEF53A | Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi med mesh |

Abdominal prolaps operation

| | |
|--------|--|
| KLEF43 | Abdominal operation for enterocele |
| KLEF50 | Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi |
| KLEF63 | Abdominal lateral kolpopeksi |

Abdominal prolaps operation med mesh

| | | |
|---------|---|----------------|
| KLEF43A | Abdominal operation for enterocele med mesh | |
| KLEF50A | Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. mesh | Kolposakropexi |
| Mangler | Abdominal kolpopeksi med mesh | |

Laparoskopisk operation for prolaps

| | |
|---------|--|
| KLEF51 | Laparoskopisk apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi |
| KLEF51A | Laparoskopisk apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. mesh |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| KLCG21 | Laparoskopisk hysteropeksi |
| KLCG21A | Laparoskopisk hysteropeksi med mesh |

| | | |
|---|--|--|
| Andre operationer, vulva og vagina | | |
| KLFE96 | Anden rekonstruktion på perineum eller vulva | Anvendes ved perineoplastik/ vulvoplastik |
| KLEE00 | Sutur af vagina | F.eks. slimhinde dække af mesh |
| KLFE00 | Sutur af vulva | F.eks. stramning i perineum efter fødselsbristninger |

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| Tillægskoder ved brug af Robot / Mesh / Angivelse af suturtype (anvendt til suspension / plastik) | | |
| KZXX00 | Tillægskode for anvendelse af robot | |
| KZXF87A | Anvendelse af kunststof mesh | Tillægskode – bruges ved behov for indsættelse eller fjernelse af net eller slynge. Kunststof mesh = helt eller delvist syntetisk net eller slynge |
| KZXF87B | Anvendelse af biologisk mesh | |
| KZXF84A | Ikke resorberbar sutur | |
| KZXF84B | Korttidsresorberbar sutur (< 3 uger) | |
| KZXF84C | Langtidsresorberbar sutur | |

KOMPLIKATIONSKODER. Obs: bruges KUN ved intervention

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, diagnoser | | Intervention |
| Peroperative | | |
| DT812UD | Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære | Perforation af slynge |
| DT812UE | Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---|
| DT812UC | Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder | |
| DT812G | Tarmlæsion | |
| DT812H | Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af kvindeligt kønsorgan | |
| DT818F | Peroperativ blødning UNS | Transfusion |
| Postoperative komplikationer < 30 dage | | |
| DT810H | Postoperativt hæmatom UNS | Drænage |
| DR339D | Residualurin | Kateterisation mere end 24 timer eller når kateterisation nødvendiggør indlæggelse, løsning/overskæring af slynge |
| DR102B | Mavesmerter lokaliseret til bækken | Bruges kun hvis hovedårsag til henvendelse |
| DT810G | Postoperativ blødning | Transfusion |
| DT814F | Postoperativ sårinfektion | Drænage og/eller antibiotika |
| DT814U | Postoperativ urinvejsinfektion | Antibiotika |
| DR391 | Vandladningsbesvær UNS | Subjektivt blæretømningsbesvær i mere end 7 dage postoperativt |
| Komplikationer >30 dage efter operation | | |
| DT835 | Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i urinvejene | F.eks. ved erosion til blære, ureter, urethra |
| DT836 | Infektion eller inflammation omkring protese, implantat eller transplantat i kønsorganerne | F.eks. ved erosion til vagina |
| DT818J1 | Postoperative kroniske smerter efter gynækologisk operation. | Eks. smerter efter TVT: |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| | | Aktionsdiagnose DT818J1, bidiagnose DT836 (erosion til vagina), tillægskode KLEG10 |
| DR522B | Smerter i kønsorganer | |
| DT983C | Postoperativ seksuel dysfunktion | |

| Komplikationer til inkontinens og prolaps kirurgi, procedurer | | |
|--|---|---|
| KTLE10 | FJ FML fra vagina | Bruges ved erosion til vagina |
| KTLW99A | Løsning eller overskæring af vaginal slynge | Bruges ved indgreb overfor stram slynge |
| KTLW99B | Stramning af vaginal slynge | Bruges ved stramning af eksisterende slynge |
| KKCF00 | Cystotomi med FJ FML | Bruges ved erosion til blære |
| KKCF01 | Perkut. endoskopisk FJ FML i urinblære | |
| KKCF02 | Cystoskopisk FJ FML i urinblære | |
| KKDE20 | FJ FML fra urinrør | Bruges ved erosion til urethra |
| KKDE22 | Uretroskopisk FJ FML fra urinrør | |
| KKBF00 | FJ FML i urinleder | Bruges ved erosion til ureter |
| KLWW96A | FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation | Bruges ved fjernelse af mesh (net eller slynge) urogenitalt |
| KLWW97A | Laparoskopisk FJ FML i bækkenhulen efter gynækologisk operation | |

*) FJ = fjernelse; FML = fremmedlegeme

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Samarbejde med tilstødende specialer | | |
| BXXB0 | Tværfaglig udredning og behandling | Tillægskode ved samarbejde med andre specialer |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | Omfatter | Vejledning |
|--|-----------------|-------------------|

| | | |
|----------|---------------------------------|--|
| ZZ0149WA | Tværfaglig klinisk undersøgelse | Tillægskode ved samarbejde med andre specialer |
| ZZ0190 | Tværfaglig konference | Tillægskode ved samarbejde med andre specialer |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Diverse procedurekoder | | |
| BNLA | Fysioterapi | Biomekanisk bevægelsesterapi |
| BWAA31 | Injektion af antiinflammatorika og/ eller lokal anæstetika | Mediceringivning ved injektion subcutant eller i vagina |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Diagnosekoder relateret til behandling med støttestessar | | |
| DN898H | Sår i vagina forårsaget af pessar | |

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Procedurekoder relateret til behandling med støttestessar | | |
| BJDA0 | Vaginalringsbehandling | Bruges ved kontrol pga. behandling med vaginalring |
| BJDZ0 | Indlæggelse af vaginalring | |
| BJDZ2 | Fjernelse af vaginalring | |