

Tabel 1. Kliniske og demografiske karakteristika

	NSA	SA	Total
Deltagelse	86 (42)	121 (58)	207 (100)
Baseline (%) - deltagelse			
PISQ-IR			
Komplet PISQ-IR (%)	82(95)	119(98)	201(97)
Ikke komplet PISQ-IR (%)	4 (5)	2 (2)	6 (3)
Retest (%) - deltagelse	68 (83)	63 (52)	131 (63)
Komplet PISQ-IR (%)	68 (100)	61 (97)	129 (98)
Ikke komplet PISQ-IR (%)	0	2 (3)	2 (2)
Demografi (oplyst)			
Alder år +/- SD	67.3 +/-11.6	54.7 +/-14.1	59.8 +/- 14.5
BMI +/- SD	27.0 +/- 4.6	26.3 +/- 4.0	26.6 +/- 4.3
Seksual partner (n=x)			
Ja (%)	NA	115 (96)	
Nej (%)	NA	5 (4)	
Postmenopausal * (n=x)	78	65	143
Graviditeter +/- SD	2.7 +/- 1.7	2.5 +/- 1.1	2.6 +/- 1.4
Vaginale fødsler +/- SD	2.2 +/- 1.0	2.2 +/- 1.1	2.2 +/- 1.0
Kejsersnit +/- SD	.13 +/- 0.4	.16 +/- 0.5	.14 +/- 0.4
Kliniske diagnoser (n=x)			
Cystocele	61	74	135
Rectocele	35	43	78
Vaginal prolapse	27	39	66
Urininkontinens	55	70	125
Afføringsinkontinens	4	3	7

NSA – ikke seksuelt aktive

SA – seksuelt aktive

* Et år efter menstruation